


# Mozolov

2,0 km

## *Lidová architektura*

V obci jsou zachovány dvě roubenky po pravé straně cesty.



*Druhy spojování trámů u roubenek: „na rybinu“ a „na zámek“*


Úvozová cesta je lemována z obou stran kamennými tarasy, na jedné straně 3 až 4 metry vysokým. Nad touto opěrnou zdí byla pole, na která se jezdilo po pěti úzkých terasovitých vjezdech ze skládaného kamene.

## *Lidový kroj*

V českých zemích se kroje nenosily příliš dlouho, v průměru do poloviny 19.století. Na Nadějkovsku se nosil táborský (též kozácký kroj). Táborsko, zvané též Kozácko, zřejmě pro častý chov koz, sousedí na severu se středočeskou oblastí a proto se i zdejší krojové prvky vzájemně prolínají. Kroj není stylově příliš výrazný, ale byl velmi oblíbený i ve 20. století, zejména na různých národních slavnostech před 2.světovou válkou.

Ženské sukně byly často i v 19.století ručně tkané, dále byly oblíbené velkokvěté kašmíry, zvané „Jiříkovo vidění“. Šněrovačky byly vyztužené kosticemi, ale šité postaru ze sukna. Výrazná je na táborském kroji zejména výšivka. Je bílá, ale precizní a velmi vkusná, vyšitá na zástěrách, kosičkách, či širokých bílých sukních. Podoba mužského kroje je méně doložená, ale předpokládá se, že se nelišil od ostatních mužských krojů, tedy že obsahoval modré a zelené svrchní části, koženky, košile, a běžné čepice s klobouky.

## Rostlinstvo a živočišstvo



Na mezích a na okrajích hájů rostou dva druhy smržovitých hub: **smrž jedlý** (*Morchella esculenta*) a **kačenka česká** (*Ptychovera bohemica*), které jsou jinak popsány hlavně na vápencích. Najdeme je již časně zjara, v dubnu až květnu. Obě houby jsou jedlé a výborné. Poněkud bizarním zjevem nás od července do září zaujme houba **hvězdovka trojitá** (*Geastrum triplex*). Její plodnice mají v mládí cibulovitý tvar, jsou asi 4-6 cm široké, světle až tmavě hnědé. Vnější obal později puká ve 4 - 7 cípů (nejčastěji v 5) do hvězdovitěho tvaru. Uvnitř hvězdice zůstává vnitřní kulovitá plodná část („vajíčko“) s výtrusným prachem.

*Kačenka česká*

Časně zjara můžeme mezi listím najít **podbílek šupinatý** (*Lathraea squamaria*). Jeho silné lodyhy mají stejně jako drobné lístky a květy sytě růžovou barvu. Podbílek nevytváří zelené barvivo (chlorofyl) a látky potřebné k životu získává tím, že cizopasí na kořenech listnatých stromů.

*Podbílek šupinatý*

**Růže galská** (*Rosa gallica*) z čeledi růžovitých je nízký poléhavý keřík s trojčetnými až pětičetnými listy a velkými, růžově nebo fialově červenými květy. Roste na okraji houštin při cestě.

V rybníčku, který je navštěvován divokými kachnami, žije dravý brouk **potápník vroubený** (*Dytiscus marginalis*), lovíci různé larvy a rybí plůdek. Neméně dravé jsou jeho larvy, ozbrojené šavlovitě zahnutými kusadly. Naopak téměř výhradně rostlinstvem se živí **ondatra pižmová** (*Ondatra zibetica*). Nevyhýbá se však ani rakům a škeblím, někdy nakousne i zdechlou rybu. Ondatra pochází ze Severní Ameriky, kde byla odpradávná lovena – Indiány pro maso, bělochy pro kožešinu. V Čechách se objevila díky hraběti Colloredo–Mansfeldovi, který v roce 1905 dal vpustit na rybník ve Staré Huti u Dobříše deset párů. Ondatry zde našly ideální podmínky, začaly se silně množit, vbrzku osídlily celé Čechy a rozšířily se i za jejich hranice.



*Značená cesta úvozem a lesem Kladiny do údolí u rybníka Kadoch.*